



ZALECENIA PO ZABIEGU

LECZENIA HEMOROIDÓW METODĄ CELON LUB LASEREM

Pacjent może opuścić przychodnię w ciągu 2-3 godzin po zabiegu, w towarzystwie innej osoby dorosłej. Przez 24 godz. po zabiegu nie wolno spożywać alkoholu, prowadzić pojazdów mechanicznych, ani podejmować ważnych życiowo decyzji.

Po zabiegu może pojawić się u pacjenta ból i nieznaczne plamienie krwią. Zastosowanie ibuprofenu lub innych leków przeciwbólowych pozwala opanować te dolegliwości.

Po zabiegu należy zapobiegać występowaniu zaparć. W ciągu pierwszego miesiąca po zabiegu Celon zaleca się stosowanie środków rozluźniających stolec i leków flebotropowych.

Zdarza się, iż pacjenci odczuwają parcie na stolec, które mija w ciągu kilku dni.

Aby uniknąć żylaków odbytu w przyszłości, należy unikać zaparć i długotrwałego wypróżniania. Uzyskuje się to przez stosowanie diety bogatoresztkowej (warzywa, owoce) oraz leków przeciw zaparciom

Okres zwolnienia z pracy wynosi od 1 do 2 tygodni.

Bezpłatna wizyta kontrolna planowana jest 7-10 dni po zabiegu

W przypadku wystąpienia któregoś z poniższych objawów, należy skontaktować się z lekarzem :

- gorączka powyżej 39 C
- silny ból okolicy odbytu
- narastające wzdęcie i ból brzucha
- ból, który nie mija po zażyciu leków przeciwbólowych
- nieustępujące nudności lub wymioty
- dreszcze.

Leki inne:

- ketonal,
- effergal z codeiną
- plastry Transtec 52
- płyn Betadine do nasiadówek (2 razy dziennie 5-6 łyżek na miskę wody i siedzimy ok.5 minut,)
- maść Betadine do opatrunku
- laktuloza
- 1 łyżka parafiny (olej parafinowy) wypijany wieczorem
- maść przeciw bólowa Lignocainum 20mg/g
- lidoposterin,
- nasiadówki z Kalii ,
- Detralex